

Senologie Ärztlicher Dienst

Ärztlicher Dienst	Tumorektomie Mamma/ Abszessinziehung (Mamma- PE)	BET Mamma + Sentinel (Tumorektomie & Sentiel)	BET Mamma + Axilladisektion (Tumorektomie mit Axilla)	Ablatio Mamma + Sentinel	Ablatio Mamma + Axilladisektion	Skin-sparing Mastektomie + Aufbau (Ablatio mit Sentinel oder Axilla)
OP-Planung/SDS	AA/OA-Sprechstunde SDS	<i>Seno-Sprechstunde SDS Abhängig von präop Markierung</i>				
Thromboseprophylaxe präoperativ	Ja, am Vortag risikoadaptiert	Ja, am Vortag risikoadaptiert	Ja, am Vortag risikoadaptiert	Ja, am Vortag risikoadaptiert	Ja, am Vortag risikoadaptiert	Ja, am Vortag risikoadaptiert
Antibiotikaprophylaxe (cave Allergien)	Ja bei Abszess	Ja, intraoperativ				
Verordnungen präoperativ (Präoperative Verordnungen vgl. unter Punkt 9)	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause
Verordnungen postoperativ	Thromboseprophylaxe bis Spitalaustritt Abszess: Wundspülung	Thromboseprophylaxe bis Spitalaustritt Ggf. Psychoonkologie anmelden				
Verhaltensregeln	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen ab 1. postoperativen Tag, Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen, sobald Redon ex Duschen über Naht, erlaubt Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen, sobald Redon ex Duschen über Naht, erlaubt Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen, sobald Redon ex Duschen über Naht, erlaubt Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen, sobald Redon ex Duschen über Naht, erlaubt Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege	Kein Sport bis zur Kontrolle, Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen, sobald Redon ex Duschen über Naht, erlaubt Verbandwechsel siehe Punkt "Wundkontrolle" Senologie Pflege
AUF (verlängerbar)	PE: 1 Woche Abszess: 1-2 Wochen	4-6 Wochen	4-6 Wochen/Individuell	4-6 Wochen/Individuell	4-6 Wochen/Individuell	4-6 Wochen /Individuell
Rezept	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich,	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich, Spezial - BH	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich, Spezial - BH	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich, Spezial – BH, Brustepithesen	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich, Spezial – BH, Brustepithesen	Paracetamol 1 g max. 6- stündlich; Ibuprofen 600 mg max. 8-stündlich
Nachkontrolle	10 Tage postoperativ, beim Zuweiser / der Zuweiserin oder bei Operateur:in; Bei Abszess Wundspülung nach RS mit Operateur:in	Histologiebesprechung nach Tumorboard beim Operateur:in				
Besonderes/optimale Verweildauer	Ambulant (gemäss BAG nicht zwingend ambulant**)	3-4 Tage	4	3-4 Tage	5 Tage	5 - 7 Tage
Ziel VWD (Tage)	(2 -) 3, Abszess 1	3	3	3	3	4

Senologie Pflege

Aufgaben Pflege	Tumorektomie Mamma / Abszessinziision	BET Mamma + Sentinel	BET Mamma + Axilladissektion	Ablatio Mamma + Sentinel	Ablatio Mamma + Axilladissektion	Skin-sparing Mastektomie + Aufbau
Eintrittsstatus/ Zimmer richten	Tandem/Fage	Tandem/Fage	Tandem/Fage	Tandem/Fage	Tandem/Fage	Tandem/Fage
Pflegeanamnese/-prozess	Anamnese/ Kurzanamnese durch Pflegefachperson	Anamnese durch Pflegefachperson + Distress Thermometer am 1. postoperativen Tag	Anamnese durch Pflegefachperson + Distress Thermometer am 1. postoperativen Tag	Anamnese durch Pflegefachperson+ Distress Thermometer am 1. postoperativen Tag	Anamnese durch Pflegefachperson+ Distress Thermometer am 1. postoperativen Tag	Anamnese durch Pflegefachperson + Distress Thermometer am 1. postoperativen Tag
BE (siehe Punkt 9) / Urin	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause	SST bis 50j. oder bis Menopause
Kost	Postoperativ: VK sofort	Postoperativ: VK sofort	Postoperativ: VK sofort	Postoperativ: VK sofort	Postoperativ: VK sofort	Postoperativ: VK
Mobilisation/Körperpflege	Frei Duschen ab 1. postoperativen Tag.	<ul style="list-style-type: none"> - Bettbügel entfernen - BD nicht auf operierter Seite messen - Betroffenen Arm mit Herz- Kissen lagern - Mobilisation frei - Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt 	<ul style="list-style-type: none"> - Bettbügel entfernen - BD nicht auf operierter Seite messen - Betroffenen Arm mit Herz- Kissen & blaues Lagerungskissen lagern - Mobilisation frei - Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt 	<ul style="list-style-type: none"> - Bettbügel entfernen - BD nicht auf operierter Seite messen - Betroffenen Arm mit Herz- Kissen lagern - Mobilisation frei - Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt 	<ul style="list-style-type: none"> - Bettbügel entfernen - BD nicht auf operierter Seite messen - Betroffenen Arm mit Herz- Kissen & blaues Lagerungskissen lagern - Mobilisation frei - Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt 	<ul style="list-style-type: none"> - Bettbügel entfernen - BD nicht auf operierter Seite messen - Betroffenen Arm mit Herz- Kissen lagern - Mobilisation frei - Duschen nur brustabwärts (Brust muss trocken bleiben), Haare mit Kopf voran waschen. - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt
Wundkontrolle/ Verbandswechsel (VW)	Sofern noch stationär Wundspülung mit Ringer am 1. postop.-Tag	<ul style="list-style-type: none"> - VW Mamma & Redon gemäss Richtlinie: "Verbandwechsel und Redon ziehen nach Mamma-Op" - Zirkulärverband bleibt in der Regel 48h postoperativ - Danach Spezial-BH (oder eigener BH ohne Bügel) - Redon wird je nach Fördermenge gezogen - Sobald Redon ex Duschen über Naht erlaubt - Fäden der Intrakutannaht sind selbstauflösend - Comfeel werden bis zur Nachkontrolle belassen 				Individuell nach RS mit plastischen Chirurgie <ul style="list-style-type: none"> - BH – Anpassung durch klinische Fachspezialistin plastische Chirurgie
Infusion/ Schmerztherapie	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen	Sobald Pat. isst/trinkt und keine i.v. Medikation; ab 1. postoperativen Tag, Venflon ziehen
Thromboseprophylaxe	ATS Oberschenkelang bis AT	ATS Oberschenkelang bis AT Clexane n. Verordnung	ATS Oberschenkelang bis AT Clexane n. Verordnung	ATS Oberschenkelang bis AT Clexane n. Verordnung	ATS Oberschenkelang bis AT Clexane n. Verordnung	ATS Oberschenkelang bis AT Clexane n. Verordnung
Betreuung durch Fachexpertin gynäkologische Onkologie (stationär/ambulant)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulant: Erstkontakt präoperativ - Ambulant: Koordination versch. inter- und intraprofessionelle Dienste - Ambulant: Wundversorgung/Edukation/emotionale Unterstützung - Ggf. Erstversorgungsepithesen abgeben 				